

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan uji Statistik *Wilcoxon* menunjukkan nilai Asimp.Sig yang diperoleh sebesar 0.000. Karena nilai Asimp.Sig  $0.000 < 0.005$  maka  $H_1$  diterima  $H_0$  ditolak yang berarti ada yaitu terdapat perbedaan tingkat kepatuhan pada pasien sebelum diberikan pillbox dengan sesudah diberikan pillbox.

#### 5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Bagi masyarakat

Memperhatikan kesehatan dan kepatuhan dalam perawatan penyakit diabetes mellitus tipe 2 untuk kesehatan pasien sendiri agar penyakit tersebut dapat terkontrol dengan baik.

2. Bagi Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan diharapkan memberikan informasi dan motivasi secara berkelanjutan kepada pasien tentang pentingnya patuh dalam menggunakan obat anti diabetik.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Melakukan penelitian lanjutan mengenai hubungan kepatuhan penggunaan obat anti diabetik terhadap diabetes mellitus tipe 2 dan diharapkan menggunakan parameter lain untuk mengukur tingkat kepatuhan pasien.