

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sesuai penjabaran sebelumnya, bisa diambil simpulan:

1. Responden Sebagian besar merasakan efek samping berat sebanyak (26,3%), efek samping sedang sebanyak (57,9%), dan efek samping ringan sebanyak (15,8%).
2. Responden dengan kepatuhan dalam mengkonsumsi Obat Anti Tuberkulosis yaitu sejumlah 19 orang (50,0%) sedangkan responden yang tidak patuh dalam mengkonsumsi Obat Anti Tuberkulosis sebanyak 19 orang (50,0%).
3. Hasil analisis statistik menunjukkan terdapat hubungan antara Efek samping Obat Anti Tuberkulosis (OAT) terhadap kepatuhan minum obat pada pasien TB paru.

5.2 Saran

1. Peneliti selanjutnya

Kepada peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Tingkat Kepatuhan Penggunaan Obat dan Efek Samping Obat terhadap Pasien penderita Tb Paru.

2. Masyarakat

Bagi Masyarakat bisa semakin patuh melakukan pengobatan serta menggunakan sarana medis yang sudah tersedia guna mencapai statistik kepulihan yang kian baik.

3. Puskesmas

Untuk puskesmas, agar Ketika memberi obat dapat disertai dengan komunikasi, informasi, Edukasi, supaya pasien dapat semakin mengerti caranya mengkonsumsi obat secara benar serta bisa memberi pelayanan yang lebih bagus lagi.

